



ZOMANBIO

## DB3.1 感受态细胞

### DB3.1 Chemically Competent Cell

Cat.NO. ZC109

本产品仅供科研使用.请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

版本号:2018-07-17

目录编号	产品名称	包装单位
<input type="checkbox"/> ZC109-1	DB3.1 感受态细胞	10×100μl
<input type="checkbox"/> ZC109-2	DB3.1 感受态细胞	20×100μl

备注：以上包装均含有 Compcell Control Plasmid pUC19(0.1ng/μl)10μl (质量控制用)。

储存:-70°C 保存六个月。

#### 产品介绍：

本公司生产的 DB3.1 感受态细胞是采用特殊工艺处理得到的感受态细胞，可用于 DNA 的化学转化。该细胞含有 gyrA462 基因，对 ccdB 基因产物的毒性具有抵抗作用，适用于转化和扩增包含 ccdB 基因的质粒载体。使用 pUC19 质粒检测，转化效率高达  $10^8$ cfu/ $\mu$ g DNA 以上。

基因型为：F<sup>-</sup> gyrA462 endA1 Δ(sr1-recA) mcrB mrr hsdS20(r<sub>B</sub>, m<sub>B</sub>) supE44ara-14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20(Sm<sup>R</sup>) xyl-5 λ- leu mtl1

#### 产品特点：

- 适用于转化和扩增包含 ccdB 基因的质粒载体；
- 具有硫酸链霉素抗性；
- 转化效率  $10^8$ cfu/ $\mu$ g DNA 以上。

#### 操作步骤：

以下操作均按无菌条件的标准进行：

- **转化:**取感受态细胞置于冰浴中(解冻 1-2 分钟)，加入目的 DNA，轻轻混匀，在冰浴中放置 30 分钟。  
注意:所使用 DNA 体积不要超过感受态细胞悬液体积的 1/10, 100μl 感受态细胞能够被 1ng 超螺旋质粒 DNA 所饱和。
- **热激:**将离心管置于 42°C 水浴中放置 60-90 秒，然后快速将管转移到冰浴中，使细胞冷却 2-3 分钟，该过程不要摇动离心管。
- **复苏:**向每个离心管中加入 500μl 无菌的 SOC 或 LB 培养基（不含抗生素），混匀后置于 37°C 180rpm 摆床振荡培养 45-60 分钟，目的是使质粒上相关的抗性标记基因表达，使菌体复苏。
- **涂板:**根据实验要求（质粒，重组连接产物转化），吸取适量体积已转化的感受态细胞加到含相应抗生素的 SOC 或 LB 固体琼脂培养基上，将细胞均匀涂开。将平板置于室温直至液体被吸收，倒置平板，37°C 培养 12-16 小时。

#### 提示：

- 刚刚化冻的细胞，转化效率最高。化冻后感受态细胞冰浴条件下，半小时内活性无明显变化，因此，同时转化多支感受态细胞时尽量半小时内加完目的 DNA。
- 感受态细胞应保存在 -70°C，请避免反复冻融，以免降低感受态细胞的转化效率。
- 进行转化操作时，请在无菌条件下，根据相应温度要求进行实验。
- 避免用移液枪吹吸，整个过程要轻柔，尽量低温操作。
- 为防止转化实验不成功，可以保留部分连接反应液，以重新转化，将损失降到最低。